



Erhältlich in DE AT CH

Beschreibung

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).

LIPIstart™ ist eine diätetisch vollständige Spezialnahrung in Pulverform, reich an mittelkettigen Triglyceriden (MCT) und arm an langkettigen Triglyceriden (LCT). LIPIstart™ enthält alle wichtigen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente sowie die mehrfach ungesättigten Fettsäuren Arachidonsäure (ARA) und Docosahexaensäure (DHA).

Indikation

Zum Diätmanagement bei Störungen der Oxidation langkettiger Fettsäuren und anderen Funktionsstörungen, bei denen eine an MCT reiche und an LCT arme Ernährung erforderlich ist. Geeignet ab der Geburt bis 10 Jahre.

Dosierung und Anwendung

Die Tagesdosis wird vom Arzt und/oder der Ernährungsfachkraft/Diätologin festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechsellage.

WICHTIGE HINWEISE

Unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

Geeignet ab der Geburt bis 10 Jahre.

Kann ab der Geburt bis 1 Jahr als einzige Nahrungsquelle und ab der Geburt bis 10 Jahre zur ergänzenden Ernährung verwendet werden.

Nicht geeignet bei Medium-Chain-Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel (MCAD).

Bei langfristiger Anwendung von LIPIstart wird eine Überwachung des Status der essentiellen Fettsäuren und bei Bedarf eine Supplementierung empfohlen.

Nicht zur parenteralen Verwendung geeignet.

Säuglinge und Kleinkinder sollten während des Fütterns beaufsichtigt werden.

Regelmäßige Zahnreinigung wird empfohlen.

Zubereitung

Bitte befolgen Sie die Zubereitungshinweise sorgfältig. Eine fehlerhafte Zubereitung kann im schlimmsten Fall zu einer Verschlechterung des medizinischen Zustandes Ihres Kindes führen.

Zubereitung als Flaschennahrung

15%ige Standardlösung

1 Messlöffel (5 g) LIPIstart™ + 30 ml abgekochtes Trinkwasser



Vor der Zubereitung die Hände gründlich waschen.



Glasflasche und Sauger vor Gebrauch gemäß Herstellerangaben sterilisieren.



Frisches Wasser mindestens 5 Minuten abkochen und höchstens 30 Minuten wieder abkühlen lassen, damit die Temperatur nicht unter 70 °C sinkt.



Die erforderliche Menge Wasser in der Flasche abmessen. Kein destilliertes oder wiederholt aufgekochtes Wasser verwenden.



Mit dem beiliegenden Messlöffel die verordnete Menge LIPIstart™ in das Wasser geben, wobei jeder Löffel mit der Rückseite eines sauberen und trockenen Messers abgestrichen wird.



Sauger an der Flasche befestigen, Flasche verschließen und gut schütteln bis sich das Pulver aufgelöst hat. Auf Trinktemperatur abkühlen lassen (ca. 37 °C).

Vor dem Füttern einige Tropfen auf das innere Handgelenk geben und so die Temperatur testen – die Nahrung sollte sich lauwarm anfühlen, nicht heiß.

Jegliche Nahrung, die nach einer Stunde in der Flasche verbleibt, muss entsorgt werden. LIPIstart™ darf nicht wieder aufgewärmt werden, sobald das Füttern einmal begonnen hat.

Nicht in der Mikrowelle erhitzen, um Verbrühungen zu vermeiden.

LIPIstart™-Nahrung nicht kochen.

Weitere Zubereitungshinweise für ältere Kinder oder als Sondennahrung:

LIPIstart™ kann als Trink- oder Sondennahrung eingesetzt werden. Die Zubereitung erfolgt auf Anordnung des Arztes und/oder der Ernährungsfachkraft/Diätologin und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechsellage. LIPIstart™ wird üblicherweise mit Wasser zubereitet. Zubereitete Nahrung ist gekühlt innerhalb von 24 Stunden zu verbrauchen.

Nährwertinformationen

		Pro 100 ml	Pro 100 ml (bei 15 % Verdünnung)
Brennwert/Energie	kJ kcal	1967 469	295 70
Fett	g	21	3,2
davon:			
- gesättigte Fettsäuren	g	16,4	2,5
- mittelkettige Fettsäuren (MCT)	g	15,6	2,34
- einfach ungesättigte Fettsäuren	g	1,0	0,24
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren	g	2,1	0,32
- langkettige Fettsäuren	g	4,4	0,66
- Linolsäure (LA)	mg	1470	221
- α -Linolensäure (ALA)	mg	230	35
- Arachidonsäure (ARA)	mg	100	15
- Docosahexaensäure (DHA)	mg	100	15
Kohlenhydrate	g	58	8,7
davon:			
- Zucker	g	6,0	0,9
Eiweiß	g	12	1,8
Salz	g	0,53	0,08
Vitamine			
Vitamin A	$\mu\text{g RE}$	460	69
Vitamin D	μg	12	1,8
Vitamin E	mg α -TE	10	1,5
Vitamin K	μg	28	4,2
Vitamin C	mg	60	9,0
Thiamin	mg	0,60	0,09
Riboflavin	mg	0,80	0,12
Niacin	mg (mg NE)	4,2 (7,9)	0,63 (1,2)
Vitamin B6	mg	0,53	0,08
Folsäure (Folat)	μg ($\mu\text{g DFE}$)	80 (133)	12 (20)
Vitamin B12	μg	1,2	0,18
Biotin	μg	19	2,9
Pantothensäure	mg	2,9	0,44

Nährwertinformationen

		Pro 100 ml	Pro 100 ml (bei 15 % Verdünnung)
Mineralstoffe			
Natrium	mg mmol	210 9,0	32 1,4
Kalium	mg mmol	485 12	73 1,8
Chlorid	mg mmol	360 10	54 1,5
Calcium	mg mmol	400 10	60 1,5
Phosphor	mg mmol	300 10	45 1,5
Magnesium	mg mmol	45 2,0	6,8 0,3
Spurenelemente			
Eisen	mg	5,8	0,87
Zink	mg	4,7	0,71
Kupfer	mg	0,40	0,06
Mangan	mg	0,28	0,04
Selen	µg	20	3,0
Chrom	µg	13	2,0
Molybdän	µg	25	3,8
Jod	µg	92	14
Sonstige Nährstoffe			
Cholin	mg	160	24
Inositol	mg	60	9,0
L-Carnitin	mg	14	2,1
Taurin	mg	45	6,8

RE = Retinoläquivalent

NE = Niacinäquivalent

 α -TE = α -Tocopherol-Äquivalent

Osmolalität

Bei 15%iger Standardlösung 180 mOsm/l

Lagerung

Kühl und trocken lagern.

Nach dem Öffnen: Innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.

Nach Gebrauch Dose wieder gut verschließen.

Packungsgröße / Gewicht

400 g e Dose, Messlöffel enthalten

**Geschmacksrichtung**

Neutral

Bestellinformation

Bezeichnung	Packungsgröße	Geschmack	PZN (DE)	PZN (AT)
LIPIstart™	400 g Dose	○ Neutral	16826736	5389178
LIPIstart™	6 x 400 g Dosen	○ Neutral	06921971	3890483

Zutaten**Neutral**

Getrockneter Glukosesirup, pflanzliche Öle (mittelkettige Triglyceride (MCT)-Öl, Sojaöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Molkeeiweißkonzentrat (**Milch**), Tricalciumphosphat, Emulgator (E471), Kaliumchlorid, Cholinbitartrat, Trikaliumcitrat, Maltodextrin, Öl aus *Mortierella alpina*, Magnesiumhydrogenphosphat, Öl aus *Crythecodinium cohnii*, Calciumchlorid, Natriumascorbat, Natriumcaseinat (**Milch**), Dikaliumphosphat, Inositol, Taurin, Trennmittel (E340ii, E341iii), Zinkgluconat, Trinatriumcitrat, DL- α -Tocopherolacetat, L-Carnitin-L-Tartrat, Eisensulfat, Vitamin D3, Retinylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Kupfergluconat, Mangangluconat, Antioxidationsmittel (E330, E306, E304), Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Vitamin K1, Kaliumiodid, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin B12.

Unter Schutzatmosphäre verpackt.

**Enhancing Lives Together**

A Nestlé Health Science Company

Vertrieb durch:

VitaFlo Deutschland GmbH, Industriestr. 17, 61449 Steinbach
 +49 (0) 6172 253 23 40, info@vitaflo.de, www.vitaflo.de