


Entscheidungsleitfaden zur Auswahl der geeigneten Ernährungstherapie in der Pädiatrie

ENERGENIES

Klinische Diagnose: Mangelernährung und Risiko für Mangelernährung



* auch als Sondennahrung geeignet
 ** nur in Deutschland erhältlich

¹ Zu 22 g/100 ml

Klinische Diagnose: Kuhmilchallergie

Ab Geburt

Auf Basis von extensiv hydrolysiertem Molkeneiweiß (eHF)

Für 90 % der Säuglinge geeignet¹



Althéra®
66 kcal/100 ml²

Auf Basis von extensiv hydrolysiertem Molkeneiweiß (eHF)

Lactosefrei (< 0,010 g/100 ml
verzehrbares Produkt/Lebensmittel)



Alfaré®
67 kcal/100 ml³

Auf Basis von non-allergenen Aminosäuren (AAF)



Alfamino®
66 kcal/100 ml⁴

Ab 1 Jahr

Auf Basis von non-allergenen Aminosäuren (AAF)



Alfamino® Junior*
105 kcal/100 ml⁵



**Alfamino® Junior
Vanille-Geschmack**
106 kcal/100 ml⁵

Klinische Diagnose: Morbus Crohn

Ab 1 bis 4 Jahren

Trink- und Sondennahrung Oligopeptiddiät



PEPTAMEN® Junior
102 kcal/100 ml⁶

Ab 5 Jahren

Trink- und Sondennahrung Zur Remissionsinduktion und -aufrechterhaltung



Modulen® IBD
99 kcal/100 ml⁷

Wir sind für Sie und Ihre Patient:innen da!

Kontakt Daten Deutschland:



0800 1001635 (kostenfrei)



kontakt@nestlehealthsciencehub.de



www.nestlehealthscience.de

Kontakt Daten Österreich:



0800 445 522 (kostenfrei)



kontakt@nestlehealthsciencehub.de



www.nestlehealthscience.at



Nestlé HealthScience
FACHPORTAL

Neu

**Medizinisches
Fachwissen**

Jetzt entdecken:



www.nestlehealthsciencehub.de

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diäten). Unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

Wichtige Hinweise:

infasource®, Althéra®, Alfaré®, Alfamino® und Alfamino® Junior (Vanille-Geschmack): Stillen bietet Säuglingen den besten Start ins Leben. Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diäten) sind für das Diätmanagement bestimmter, medizinischer Indikationen vorgesehen und müssen unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden, nachdem alle Ernährungsoptionen einschließlich Stillen umfassend geprüft wurden. **infasource®** ist zum Diätmanagement bei erhöhtem Energiebedarf von Säuglingen und Kleinkindern. Als einzige Nahrungsquelle geeignet für Säuglinge bis zu 1 Jahr, zur ergänzenden Ernährung geeignet für Kleinkinder ab 1 Jahr. **Althéra®** ist geeignet zum Diätmanagement bei Kuhmilchallergie. **Alfaré®** ist geeignet zum Diätmanagement bei gastrointestinalen Störungen (Malabsorption und Maldigestion), Kuhmilchallergie/Nahrungsmittelunverträglichkeiten. **Alfamino® und Alfamino® Junior (Vanille-Geschmack)** sind geeignet zum Diätmanagement bei schwerer Kuhmilchallergie und/oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten. **Althéra®, Alfaré® und Alfamino®** sind als einzige Nahrungsquelle geeignet für Säuglinge von Geburt an. **Alfamino® Junior (Vanille-Geschmack)** als einzige Nahrungsquelle geeignet für Kleinkinder ab 1 Jahr.

Compleat® paediatric, isosource® Junior, resource® Junior, PEPTAMEN® Junior Trink- und Sondennahrungen: Zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung. **PEPTAMEN® Junior** Trink- und Sondennahrungen: Insbesondere bei Fettverwertungsstörungen oder Malassimilationssyndrom. **Compleat® paediatric Nature Mix, isosource® Junior, resource® Junior, PEPTAMEN® Junior** Trink- und Sondennahrungen: Als einzige Nahrungsquelle geeignet ab 1 Jahr. **Compleat® paediatric Bolus Blends und Oral Blends:** Als einzige Nahrungsquelle geeignet von 1 Jahr bis zu 14 Jahren. **Modulen® IBD:** Zum Diätmanagement bei Morbus Crohn. Als einzige Nahrungsquelle geeignet ab 5 Jahren.

Kontraindikation: **infasource®** ist nicht geeignet für Frühgeborene und bei Kuhmilcheiweißallergie. **PEPTAMEN® Junior** Trink- und Sondennahrungen sind nicht geeignet bei Kuhmilcheiweißallergie. **Althéra®, Alfaré®, Alfamino® und Alfamino® Junior (Vanille-Geschmack)** sind nicht geeignet bei Galactosämie und Glucose-Galactose-Malabsorption. Sondennahrungen nicht mit anderer Nahrung oder Arzneimitteln mischen. Nicht zur parenteralen Verwendung.

*nur in Deutschland erhältlich

¹ Vandenplas Y et al. JPGN 2024; 78 (2): 386–413. ² Zu 13,2 g/100 ml ³ Zu 13,5 g/100 ml ⁴ Zu 13,3 g/100 ml ⁵ Zu 21,8 g/100 ml ⁶ Zu 22 g/100 ml ⁷ Zu 20 g/100 ml

Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH
Baseler Straße 46
D-60329 Frankfurt am Main

Nestlé Health Science
Nestlé Österreich GmbH
Wiedner Gürtel 9
A-1100 Wien